

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

化膿を防ぐウェットタイプの殺菌消毒パット

指定医薬部外品

リバガーゼF

切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ等は日常よく見られますが、細菌からの感染を守るため、できるだけ早く殺菌消毒薬で手当することが必要です。
「リバガーゼF」は殺菌消毒液を特殊ガーゼに含ませ、これを1枚ずつアルミ袋で包装したハンディタイプの殺菌消毒ガーゼです。
アクリノールは殺菌作用が強く、しかも血清たん白の存在下でも作用が減弱しません。
有孔ポリエステルフィルム付きガーゼを使用しているので、傷口にガーゼが付着しにくく交換も容易で、はがすとき痛くありません。

△ 使用上の注意

- 次の人は使用しないで下さい。
(1) 患部が広範囲の人 (2) 深い傷やひどいやけどの人
- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人 (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

【効能又は効果】

切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒・被覆

【用法及び用量】

アルミ袋を開封し、中のガーゼをピンセットで取り出し、つやのある面を傷口にあて、添付の固定用粘着シートで被覆固定して下さい。
又、創傷面を消毒する際にはガーゼ面（つやのない面）で清拭して下さい。
創傷面が特に小さい場合には適宜折りたたむか、又は裁断の上使用して下さい。

用法及び用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (2) 患部を清潔にし、ガーゼ部分を汚さないように注意して使用して下さい。
- (3) 固定用シートの粘着面を直接患部に貼らないで下さい。
- (4) 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合にはすぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。
なお症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- (5) 外用にのみ使用して下さい。
- (6) 固定用粘着シートの貼付部位に発疹、発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合には粘着シートの使用を中止し、
包帯等他の方法で固定して下さい。
- (7) ガーゼについている透明なフィルムは、はがさずにそのまま使用して下さい。
- (8) 粘着テープに薬液が染み出すことがありますので、そのような場合は上から包帯を巻くなど、衣服を汚さないように
注意して下さい。

【成分及び分量】

本品1包（1.8g）中
アクリノール水和物0.2%液・・・・・・・・・・1.5g
基 布（4×5cm）・・・・・・・・・・0.3g
添加物 濃グリセリン

通気性の良い固定用粘着シートを使用しているため、
薬液がしみだしてくるおそれがありますので、じかに
衣類等が触れないようご注意ください。万一、薬液が付
着した場合は、すぐに付着した生地の下にガーゼ又は
タオル等をあて、酢を浸した脱脂綿等で付着部分を上
から繰り返したいて下さい。その後、酸素系漂白剤
の使用できる衣類等については、液体の酸素系漂白
剤を付着した部分に塗布して漂白して下さい。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。

玉川衛材（株）お客様相談窓口

TEL 03-3861-2037

受付時間：平日9:00-17:00（土・日・祝を除く）



ホームページ
<http://www.tamagawa-eizai.co.jp>

製造販売元

タマガワ
玉川衛材株式会社
東京都千代田区岩本町2-2-16