

2014年1月(記載要領変更に伴う改訂)

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第2類医薬品

胃痛・胃もたれ・むかつきに **スクラート胃腸薬S(散剤)**

こんな方に効きます



胃の痛み



胃もたれ



むかつき



胸やけ

胃の中が空っぽの
空腹時・睡眠中にも効く
胃痛のもとに直接効く
「患部修復機能」胃腸薬

- 胃痛のもと(荒れた患部)を保護・修復します
スクラルフアートが胃の荒れた患部を選んで吸着し、胃酸などの攻撃から保護するとともに、患部を修復して、もとから治していきます。
- 健胃生薬が弱った胃を回復します
7つの健胃生薬が胃の働きを高め、弱った胃をじっくり回復させて、元気な胃にしていきます。
- 消化酵素が弱った胃の働きを助けます
脂肪を分解するリパーゼAP12と、でんぷんを分解するビオジアスターゼ2000が、効果的に消化を助けます。
- すばやく、かつ持続的に胃酸を中和します
炭酸水素ナトリウムと合成ヒドロタルサイトが症状のもととなる胃酸をすばやくかつ持続的に中和し、胃への刺激・負担を軽減します。

△使用上の注意



してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないでください
透析療法を受けている人。
2. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 高齢者。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 次の診断を受けた人。
腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘
4. 2週間位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能

胃痛、もたれ(胃もたれ)、はきけ(むかつき)、二日酔・悪酔のむかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心、胸やけ、胃酸過多、げっぷ(おくび)、胃重、胃部膨満感、胃部不快感、胸つかえ、食べ過ぎ(過食)、消化不良、消化不良による胃部・腹部膨満感、消化促進、食欲不振(食欲減退)、飲み過ぎ(過飲)、嘔吐

用法・用量

次の量を食間*・就寝前又は食後に服用してください。

*食間とは、食後2〜3時間経過し、胃の中に食べ物がない状態の時です。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
成人(15才以上)	1 包	3 回
15才未満	×服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉用法・用量を厳守してください。

成 分 1日服用量(3包・3.9g)中

成 分	含 量	成 分	含 量
スクラルフアート水和物	1500mg	健胃生薬末	702mg
炭酸水素ナトリウム	600mg	ウイキョウ	60mg
合成ヒドロタルサイト	480mg	ウコン	60mg
ビオジアスターゼ2000	30mg	ケイヒ	300mg
リパーゼAP12	30mg	ゲンチアナ	30mg
		サンショウ	12mg
		ショウキョウ	120mg
		チョウジ	120mg

添加物として、D-マンニトール、L-メントール、マクロゴール、セルロース、二酸化ケイ素、香料を含有します。

〈成分に関連する注意〉

本剤には生薬末(生薬:薬用の草根木皮)が配合されていますので、製品により色が多少異なることがあります。また、生薬末は7つの生薬を凍結粉碎したものです。製品によっては生薬の繊維が目につくことがあります。どちらの場合も品質・効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問合せ先

お買い求めのお店又は下記にお問合せください

ライオン株式会社 お客様センター **0120-813-752**

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ライオン株式会社

〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7