

乗りもの酔いの予防と緩和に

# トラベルミン®

## チュロップ 酔ってからでも効く ぶどう味

開  
け  
し  
て  
く  
だ  
さ  
い



6錠(1錠×6包)

第2類医薬品



製造 高市製薬株式会社  
販売元 奈良県高市郡明日香村野口10

発売元 エーザイ株式会社  
東京都文京区小石川4-6-10

本品に関する  
お問い合わせは、  
エーザイ  
「hhcホットライン」へ  
**0120-161-454**  
eisai.jp

使用期限  
(西暦 年 月)  
製造番号



A4

第2類医薬品

ノンシュガー

ご使用に際して、この箱の説明文を必ず  
お読みください。また、必要な時に読める  
よう大切に保管してください。

販売名:トラベルミン チュロップぶどう味

△ 使用上の注意

☒ [してはいけないこと] [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる]

●本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。他の乗酔酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等) ●服用後、乗酔酔いは機械類の運転操作をしないでください。(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)



[相談すること]

①次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人  
(3) 高齢者 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人  
(5) 排尿困難のある人 (6) 腸内障害、心臓病の診断を受けた人 ●服用後、次の症状があらわれる場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。[皮膚] 発疹・発赤、かゆみ [精神神経系] 頭痛 [泌尿器] 排尿困難 [その他] 顔のほてり、異常なまぶしさ まれに次の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。[再生不良性貧血] 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。[無顆粒球症] 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。口のかわき、便秘、眠気、目のかすみ

● 効能・効果

乗酔酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

● 用法・用量

乗酔酔いの予防には、乗車船30分前に、右表の1回量をわむか、口中で溶かして服用してください。  
なお、追加服用する場合は、1回量を4時間以上の間隔をおいて服用してください。  
1日の服用回数は2回までとしてください。

| 年 齢     | 1 回 量 | 1日服用回数           |
|---------|-------|------------------|
| 15才以上   | 2錠    | 4時間以上の<br>間隔をおいて |
| 11才〜14才 | 2錠    | 2回まで             |
| 5才〜10才  | 1錠    | 2回まで             |
| 5才未満    | ×     | 服用しないこと          |

[用法・用量に関連する注意] ●小児(5〜14才)に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。修学旅行などに持たせる場合には、事前に用法、用量など、服用方法をよく指導してください。【ご注意】●本剤はかむか、口中で溶かして服用する薬剤です。かみにくい場合は、歯を噛めることなどのないよう、溶かして服用してください。また、誤って喉につまらせないように、十分に注意してください。●服用する時は1錠ずつとし、1度に2錠を口中に入れないでください。

■ 成分:1回量(11才以上)2錠中 ■

d-クロロフェニラミンマレイン酸塩 …… 1.33mg  
スコボラミン臭化水素酸塩水和物 …… 0.166mg  
添加物として、エタノール、クエン酸、プロピレングリコール、L-メントール、香料、アセチルファムK、インマル、グリセリン脂肪酸エステル、銅クロロフィリンNaを含有

■ 保管及び取扱上の注意 ■

①直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。②小児の手の届かない所に保管してください。③他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

④使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独) 医薬品医療機器総合機構  
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/gai/index.html  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

MOTION SICKNESS REMEDY  
**Travelmin®Churopp**  
**Grape Flavor**  
(For 5 or more years old)

JAN バーコード