

乗りもの酔いの予防と緩和に

トラベルミン®

チュロップ しモン味

開
押
し
て
く
だ
さ
い



5才以上から大人の方まで服用できます。

6錠(1錠×6包) 第2類医薬品



製造 高市製薬株式会社
販売元 奈良県高市郡明日香村野口10

発売元 エーザイ株式会社
東京都文京区小石川4-6-10

本品に関する
お問い合わせは、
エーザイ
「hhcホットライン」へ
0120-161-454

eisai.jp

使用期限
(西暦 年 月)
製造番号



A4

第2類医薬品

ノンシュガー

ご使用に際して、この箱の説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

❌【してはいけないこと】 【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる】

❶本剤を服用する際は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。他の乗り酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等) ❷服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)

❸次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■【相談すること】 (1) 高年齢者 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 高齢者 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5) 排尿困難のある人 (6) 経内臓、心臓病の診断を受けた人 ❹服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この薬を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。【皮膚】発疹・発赤、かゆみ 【精神神経】頭暈 【泌尿器】排尿困難 【その他】顔のほてり、異常なまぶしさ まれに次の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。【再生不良性貧血】青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。【無顆粒球症】突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。 ❺服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この薬を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 □のかわき、便秘、眠気、目のかすみ

■【効能・効果】

乗り酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

■【用法・用量】

乗り酔いの予防には、乗車前30分前に、右表の1回量をむか、口中で溶かして服用してください。

なお、追加服用する場合は、1回量を4時間以上の間隔をおいて服用してください。

1日の服用回数は2回までとしてください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
15才以上	2錠	4時間以上の間隔をおいて
11才～14才	1錠	2回まで
5才～10才	1錠	2回まで
5才未満	×服用しないこと	

【用法・用量に関連する注意】 ●小児(5～14才)に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。修学旅行などに持たせる場合には、事前に用法、用量など、服用方法をよく指導してください。【ご注意】 ●本剤はかむか、口中で溶かして服用する薬剤です。かみない場合は、歯を傷めることなどのないように、溶かして服用してください。また、誤って喉につまらせないように、十分に注意してください。 ●服用する時は1錠ずつとし、1度に2錠を口中に入れないでください。

■成分:1回量(11才以上)2錠中

d-グルフェニラミンマレイン酸塩 …… 1.33mg
スコバロミン臭化水素酸塩水和物 …… 0.166mg

添加物として、クエン酸、L-メントール、香料、アセチルファムK、イソマル、グリセリン脂肪酸エステル、ビタミンB₂を含有

■保管及び取扱い上の注意

❶直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。❷小児の手の届かない所に保管してください。❸他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)❹使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/camp/index.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

MOTION SICKNESS REMEDY
Travelmin®Chupor
Lemon Flavor
(For 5 or more years old)

JAN バーコード