



服用前に、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう保管してください。

おなかが痛い下痢、食あたりに

ビオフェルミン®下痢止め

ビフィズス菌入り下痢止め

第2類医薬品

特 徴

●腸の動きを整えながら殺菌

タンニン酸ベルベリンが腸の過剰な動きを整えて下痢に効きます。また、腸管内で殺菌作用を有して食あたりに効きます。

●鎮痛鎮痙作用のある生薬


ジャクヤクエキスとロートエキスが下痢でおなかが痛いときによく効きます。

●腸粘膜を保護し、腸の動きを整える

ゲンノショウコ乾燥エキスが荒れた腸粘膜を保護し、腸の過剰な動きを整えます。

●腸内環境を整える

ビフィズス菌が下痢で乱れた腸内環境に作用し、腸の調子を整えます。



イメージ図

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含む他の胃腸薬、乗物酔い薬
2. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください
(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります)
3. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人または粘液便の続く人。
 - (3) 急性の激しい下痢または腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人。
(本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがあります)
 - (4) 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (5) 高齢者。
 - (6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (7) 次の症状のある人。
排尿困難
 - (8) 次の診断を受けた人。
心臓病、緑内障
 - (9) 副交感神経遮断剤(ペラドンナ総アルカロイド、ヨウ化イソプロパミド、ロートエキス等)を含む内服薬を服用している人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	顔のほてり、異常なまぶしさ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
口のかわき、目のかすみ
4. 5～6日間服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

その他の注意

母乳が出にくくなることがあります。

効 能

腹痛を伴う下痢、下痢、消化不良による下痢、
食あたり、水あたり、はき下し、くだり腹、軟便



用法・用量


次の量を、食後に水またはお湯で服用してください。

年 令	1 回 量	服 用 回 数
15 才 以 上	3 錠	1 日 3 回
11才 ～ 14才	2 錠	
11 才 未 満	服用しないこと	

<注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)



成 分 9 錠中

成 分	分 量	は た ら き
タンニン酸ベルベリン	300mg	腸の過剰な動きを整えて下痢に効きます。また腸管内で殺菌作用を有し食あたりに効きます。
ゲンノショウコ乾燥エキス	420mg (ゲンノショウコ約4,200mgより抽出)	荒れた腸粘膜を保護し、腸の過剰な動きを整えます。
ロートエキス	33mg	2つの生薬成分が、下痢でおなかが痛いときによく効きます。
シャクヤクエキス	125mg (シャクヤク約500mgより抽出)	
ビフィズス菌	30mg	下痢で乱れた腸内環境に作用し、腸の調子を整えます。


添加物：トウモロコシデンプン、アメ粉、カルメロースカルシウム、タルク、ステアリン酸マグネシウム

<注意>

生薬(薬用の草根木皮など)を用いた製品ですから、製品により錠剤の色調や味が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 錠剤の裏のアルミ箔に傷がつかないように保管してください。本剤は吸湿しやすいため、錠剤が変色したり、品質が変わる原因となります。変色した錠剤は服用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
なお、使用期限内であっても、開封後は6ヵ月以内に服用してください。(品質保持のため)
- (6) 箱の「開封年月日」記入欄に、内袋(アルミ袋)を開封した日付を記入してください。



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

【連絡先】 大正製薬株式会社 お客様119番室

【電 話】 03-3985-1800

【受付時間】 8:30~17:00(土、日、祝日を除く)

※受付時間の詳細は、大正製薬ホームページにてご確認ください

製造販売元 **ビオフェルミン製薬株式会社** 販売元 **大正製薬株式会社**

神戸市西区井吹台東町七丁目3番4

東京都豊島区高田3丁目24番1号

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話:0120-149-931(フリーダイヤル)